


Mi vida con nefritis lúpica es

impredicible



¿Qué es la nefritis lúpica?

- Una inflamación de los riñones producida por el lupus que provoca daño renal irreversible
- Una complicación que puede desarrollarse en alrededor de 1 en 2 personas que viven con lupus
- Un ataque en los riñones que, si no se trata, puede provocar insuficiencia renal, lo que podría requerir diálisis o un trasplante de riñón

El análisis de orina de rutina realizado por un médico es fundamental para detectar los síntomas (como la proteína en la orina) de forma temprana y para monitorear la progresión de la enfermedad.



El objetivo del tratamiento es detener el ataque de la nefritis lúpica a los riñones y ayudar a protegerlos de más daños permanentes.

¿QUÉ ES LUPKYNIS® (voclosporina)?

LUPKYNIS es un medicamento de venta con prescripción que se utiliza con otros medicamentos para tratar a adultos con nefritis lúpica activa. LUPKYNIS no debe tomarse con un medicamento llamado ciclofosfamida. Hable con su proveedor de atención médica si no estás seguro de si debes tomar este medicamento.

Lupkynis[®]
(voclosporin) capsules
7.9 mg

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

LUPKYNIS puede causar efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Aumento del riesgo de cáncer.** Las personas que toman LUPKYNIS tienen un mayor riesgo de padecer algunos tipos de cánceres, incluido el cáncer de piel y de ganglios linfáticos (linfoma). Limite y evite la exposición a la luz solar y a la luz UV, como las máquinas bronceadoras. Use ropa con protección y un protector solar.

Información de seguridad importante (continuación)

Representación de actores

LUPKYNIS ayuda a sacar la *lucha en mí*

LUPKYNIS® (voclosporina) es el primer tratamiento oral aprobado por la FDA para la nefritis lúpica que ha demostrado clínicamente que ayuda a detener el ataque de la enfermedad y a proteger los riñones de mayores daños. En ensayos clínicos, se demostró que LUPKYNIS^a:



Ayuda a controlar la nefritis lúpica

En las personas que tomaron LUPKYNIS, las probabilidades de tener la nefritis lúpica bajo control^b después de un año de tratamiento fueron casi **3 veces mayor^c** que en aquellas que tomaron solamente micofenolato de mofetilo (MMF) y esteroides.




Reduce la dosis de esteroides necesaria

LUPKYNIS ayudó a detener el ataque de la nefritis lúpica con esteroides en dosis bajas.



Reduce la proteína en orina

Las personas que tomaron LUPKYNIS vieron una **reducción del 50%** de la proteína en la orina (llamada proteinuria, un signo clave de la actividad de la enfermedad), en promedio después de solo un mes.



BUENO,
VAMOS A
HACERLO

Siéntase informado sobre su tratamiento

- Es un medicamento oral tomado 2 veces al día^d
- El cronograma de dosis permanece igual durante el tratamiento^d
- Estudiado en personas de diferentes razas y orígenes étnicos

Más información en [LUPKYNIS.com](https://www.lupkynis.com)

^aComo parte de un plan de tratamiento que incluía MMF y esteroides.

^bEl control se definió como la reducción de la proteína en la orina a ≤ 0.5 mg/mg, a la vez que ayudó a mantener la función renal.

^cEl coeficiente de probabilidades fue de 2.7. El coeficiente de probabilidades se determinó comparando la probabilidad de que alguien que tomaba LUPKYNIS con MMF y esteroides tuviera su

nefritis lúpica bajo control después de 1 año de tratamiento con la probabilidad de alguien que tomaba solamente MMF y esteroides.

^dSu médico determinará la dosis adecuada para usted y lo monitoreará durante todo el tratamiento para ver si es necesario cambiar su dosis. Tome siempre LUPKYNIS según las indicaciones de su médico.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

(continuación)

• **Aumento del riesgo de infección.** LUPKYNIS es un medicamento que afecta al sistema inmunitario. LUPKYNIS puede reducir la capacidad de su sistema inmunitario para combatir infecciones. Pueden producirse infecciones graves en personas que toman LUPKYNIS que pueden dar lugar a hospitalizaciones y pueden provocar la muerte.

Llame a su proveedor de atención médica de inmediato

si tiene síntomas de una infección como fiebre, sudores o escalofríos, tos o síntomas parecidos a los de la gripe, dolores musculares o zonas de la piel calientes, enrojecidas o dolorosas.

No tome LUPKYNIS No tome LUPKYNIS con medicamentos conocidos como inhibidores potentes del CYP3A4, como ketoconazol, itraconazol y claritromicina, o si es alérgico a cualquiera de los componentes de LUPKYNIS. No debe comer pomelo (toronja) ni beber jugo de pomelo mientras esté tomando LUPKYNIS.

Antes de usar LUPKYNIS, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si:

- Planea recibir cualquier vacuna. No debe recibir vacunas elaboradas con virus vivos durante el tratamiento con LUPKYNIS. Es posible que otras vacunas no funcionen tan bien durante el tratamiento con LUPKYNIS.
- Tiene o ha tenido problemas hepáticos, renales o cardíacos.
- Tiene presión arterial alta.
- Está embarazada o planea quedar embarazada o está en período de lactancia o planea amamantar cuando tome LUPKYNIS. Cuando tome LUPKYNIS en combinación con micofenolato de mofetilo, lea la guía del medicamento del micofenolato de mofetilo para obtener información importante sobre el embarazo. Estos medicamentos pueden causar daño al feto o al lactante.


Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que tome, incluidos los medicamentos con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. LUPKYNIS puede afectar la forma en que funcionan otros medicamentos, y otros medicamentos pueden afectar cómo funciona LUPKYNIS.

Información de seguridad importante (continuación)

Con apoyo personalizado nunca luchará solo

Aurinia Alliance® es un programa de apoyo personalizado de Aurinia, los fabricantes de LUPKYNIS, creado para acompañarlo durante su tratamiento. El programa está diseñado para:

- Ayudarlo a entender mejor la nefritis lúpica
- Ayudarlo a navegar por los seguros, las opciones de financiación y los costos de LUPKYNIS
- Apoyarlo para que se mantenga encaminado con LUPKYNIS



Obtenga más información en [AuriniaAlliance.com](https://www.AuriniaAlliance.com)
o llame al **1-833-AURINIA** (1-833-287-4642)

Una vez que se inscriba, estará en contacto con un enfermero administrador de casos, quien será su contacto directo durante el recorrido con su tratamiento con LUPKYNIS.

Preguntas frecuentes

¿Qué es LUPKYNIS® (voclosporina)?

LUPKYNIS es el primer medicamento oral aprobado por la FDA específicamente para adultos con nefritis lúpica activa.

¿Cómo se toma LUPKYNIS?

LUPKYNIS se toma por vía oral dos veces al día. Tome siempre la dosis recomendada que le recete su médico.

¿Cómo funciona LUPKYNIS?

LUPKYNIS actúa para calmar el sistema inmunitario, que hace que el organismo ataque a las células de los riñones. Ayuda a reducir la inflamación y a proteger las células específicas de los riñones para que sigan funcionando.

¿Se estudió LUPKYNIS en poblaciones diversas?

LUPKYNIS se probó en estudios clínicos en los que participaron más de 350 personas de diferentes razas y orígenes étnicos.

Hable con su médico sobre LUPKYNIS

LUPKYNIS.com

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

LUPKYNIS puede causar efectos secundarios graves, incluidos:

Problemas renales. Los problemas renales son efectos secundarios frecuentes de LUPKYNIS y pueden ser graves. Su proveedor de atención médica puede hacer ciertas pruebas para controlar su función renal mientras toma LUPKYNIS.

Presión arterial alta. La presión arterial alta es un efecto secundario frecuente de LUPKYNIS y puede ser grave. Su proveedor de atención médica controlará su presión arterial mientras toma LUPKYNIS y puede pedirle que compruebe su presión arterial en su hogar.

Problemas del sistema nervioso. Los problemas del sistema nervioso son un efecto secundario frecuente de LUPKYNIS y pueden ser graves. Llame a su proveedor de atención médica o acuda inmediatamente al servicio de urgencias del hospital más cercano si experimenta alguno de estos síntomas mientras toma LUPKYNIS:

- confusión
- cambios en el estado de alerta
- temblores musculares
- entumecimiento y hormigueo
- dolor de cabeza
- convulsiones
- cambios en la visión

Niveles altos de potasio en sangre. Su proveedor de atención médica puede hacer ciertas pruebas para revisar sus niveles de potasio mientras toma LUPKYNIS.

Un problema grave del ritmo cardíaco (prolongación del QT).

Recuento extremadamente bajo de glóbulos rojos (anemia). Su proveedor de atención médica puede revisar sus análisis de laboratorio mientras usa LUPKYNIS.

Los efectos secundarios más frecuentes de LUPKYNIS son diarrea, dolor de cabeza, tos, infección urinaria, dolor de estómago, ardor de estómago y pérdida de cabello (alopecia).

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de LUPKYNIS. Para obtener más información, consulte a su proveedor de atención médica. Puede informar los efectos secundarios a la FDA al **1-800-FDA-1088**. También puede informar los efectos secundarios en www.fda.gov/medwatch.

Consulte la Información de prescripción, incluido el Recuadro de advertencia y la Guía del medicamento.

© 2023 Aurinia Pharma U.S., Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas son propiedad de Aurinia Pharmaceuticals Inc.
US-LUP-2200051 02/23